

Низорал

Форма выпуска

Шампунь.

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Кетоконазол, синтетическое производное имидазол-диоксолана, обладает противогрибковым действием в отношении дерматофитов, таких как *Trichophyton sp.*, *Epidermophyton sp.*, *Microsporum sp.*, и дрожжей, таких как *Candida sp.* и *Malassezia furfur* (*Pityrosporum ovale*). Шампунь с кетоконазолом быстро уменьшает шелушение и зуд, которые обычно ассоциируются с перхотью, себорейной экземой и отрубевидным лишаем.

Фармакокинетика

Всасывание кетоконазола через кожу при местном применении незначительно. Поскольку даже при длительном применении содержание кетоконазола в крови не определяется, можно прийти к заключению, что системным действием препарат не обладает.

Показания

Лечение и профилактика поражений кожи, вызванных дрожжеподобными микроорганизмами *Malassezia furfur* (*Pityrosporum ovale*), таких как перхоть и отрубевидный лишай (локальный).

Противопоказания



Повышенная чувствительность к любому из компонентов шампуня.

Особые указания

При использовании шампуня следует избегать попадания его в глаза. При попадании шампуня в глаза необходимо промыть их водой.

Для предотвращения синдрома отмены при длительном местном лечении кортикостероидами рекомендуется продолжать местное применение кортикостероидов в сочетании с шампунем Низорал 2 % с последующей постепенной отменой кортикостероидов в течение 2-3 недель.

Себорейный дерматит и перхоть часто сопровождаются усиленным выпадением волос. В редких случаях усиленное выпадение волос отмечалось при применении шампуня Низорал 2 %.

Состав

Активное вещество: кетоконазол, 21 мг/г (с учетом 5% избытка). Вспомогательные вещества: макрогола метилдекстрозы диолеат, имидомочевина, кокоил диэтаноламид, коллагена гидролизат, натрия гидроксид, натрия лаурилсульфат, натрия лаурилсульфосукцинат, натрия хлорид, хлористоводородная кислота, ароматизатор, краситель красный очаровательный (E 129), вода.

Способ применения и дозы

На пораженные участки нанести шампунь Низорал 2 % на 3-5 минут, затем промыть водой.

Лечение:

- Перхоть и себорейная экзема: два раза в неделю в течение 3-4 недель.
- Отрубевидный лишай: ежедневно в течение 5 дней.

Профилактика:

- Перхоть и себорейная экзема: еженедельно или 1 раз в две недели.
- Отрубевидный лишай: ежедневно в течение 3 дней (разовый курс лечения) перед наступлением лета.

Побочные действия

Шампунь Низорал 2 % обычно хорошо переносится. Как и при использовании других шампуней может отмечаться местное раздражение, зуд или контактный дерматит

(вследствие раздражения или аллергической реакции) Волосы могут становиться жирными или сухими. Однако при использовании шампуня Низорал 2 % такие явления отмечаются редко.

В отдельных случаях, в основном у пациентов с химически поврежденными или седыми волосами, отмечалось изменение цвета волос.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в месте, не доступном для детей.

Действующее вещество

Кетоконазол

Пол

Унисекс

Тип

Лечебный шампунь

Тип волос

Для всех типов

Эффект

Против перхоти